



## Contexte

La Société Française de Gériatrie et de Gérontologie (SFGG) a rejoint l'initiative internationale « Choisir avec soin » (Choosing wisely).

Dans ce cadre, la SFGG a défini 5 recommandations correspondant à des situations courantes en gériatrie et à risque de soins non pertinents.

Ces recommandations ciblent :

- o le dépistage des infections urinaires
- o les traitements psychotropes chez les sujets âgés
- o les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) au long cours
- o la décision partagée

En partenariat avec le CAPPS Bretagne et France Assos Santé Bretagne, une démarche d'analyse des pratiques a été proposée aux établissements sanitaires et EHPAD bretons sur la base des 5 recommandations de la SFGG.



**Objectif :** favoriser l'appropriation des 5 recommandations de la SFGG et améliorer la pertinence des soins aux personnes âgées

## Méthode et outils

### S'ÉVALUER

- o avec des grilles de recueil en ligne
- o via audit de dossiers un jour donné ou entretiens semi-dirigés

### SE SITUER

- o par rapport à la moyenne des résultats régionaux
- o sur des indicateurs de pratique clinique

### S'AMÉLIORER

- o avec des boîtes à outils sélectionnées par les gériatres



## Résultats



### Participants

34


établissements

88

services

Les services se sont évalués en moyenne sur **3** recommandations

### Répartition des services



Recos SFGG	Indicateurs	Résultats bretons <sup>1</sup>
 IPP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Absence d'indication au long cours ou posologie inadaptée</li> </ul>	<b>70 %</b> (400/572)
 Benzodiazépines	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patients sous benzodiazépines ou composés Z</li> <li>Absence de tentative de déprescription pour les traitements &gt; 3 mois</li> </ul>	<b>50 %</b> (801/1606) <b>71 %</b> (489/692)
 Antipsychotiques (AP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patients traités par AP pour SPC<sup>2</sup> parmi ceux présentant des troubles neurocognitifs majeurs</li> <li>Absence de tentative de déprescription parmi les prescriptions d'AP non faites dans l'unité</li> </ul>	<b>31 %</b> (210/678) <b>67 %</b> (58/86)
 Analyse d'urine	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bandelette urinaire ou ECBU non pertinents</li> </ul>	<b>26 %</b> (39/136)
 Décision partagée	<ul style="list-style-type: none"> <li>Echange avec un professionnel sur les besoins en soins</li> <li>Proposition de rédaction de directives anticipées</li> </ul>	<b>74 %</b> (72/97) <b>21 %</b> (15/97)

<sup>1</sup> Taux moyen calculé à partir des dossiers patients analysés par les services bretons ayant participé à la campagne  
<sup>2</sup> SPC : symptômes psychologiques et comportementaux

